



Türkiye

Discover
the potential

Birlikten GÜÇ DOĞAR!

Ekip Çalışması Takım Ruhu Planlı Arge İnovasyon

unaluem





Ünal yem 1990 yılında ÇORUM organize sanayi bölgesinde 2000 m² kapalı 8000 m² açık olan olmak üzere 10000 m² alan üzerine bölge ihtiyacına cevap vermek üzere üretime başlamıştır.

Halkımızdan, tedarikçiden ve bayilerden öğrendiğimizi, kendi tecrübe ve birikimlerimizle; ilim ve bilginin ışığında kalitemizden taviz vermeyerek, her geçen gün sizlere daha iyi hizmet için çalışıyoruz.

Bugün gelinen noktada 8500 m² kapalı ve 11600 m² açık olmak üzere 20100 m² alan ile üreticilerimize hizmet vermekteyiz.

Ekip çalışmasına, takım ruhuna inanan ve aile şirketi olması sebebiyle birlikten güç doğar anlayışı ile yoluna devam eden Ünal Yem bölgesel olarak başladığı hedef kitlesinin çitasını yükselterek ulusal yapıda yem üreticisi olma yolundadır.

Haydar SARIASLAN

Kurucu / Founder

www.unalyem.com.tr



% 16 Ham Protein 2500 kcal metabolik enerji içeren düşük ve orta verimli süt siğirlerinde kullanılan lezzetli ve vitaminli süt yemidir.

Ambalaj

Fiziksel Şekli



PELET-GRANÜL

DÖL VERİMİNDE BESLENMEYE BAĞLI FAKTÖRLER

- Enerji yetersizliği
- Protein fazlalığı (kanda aşırı azot)
- Vücut kondüsyonunda azalma(zayıflık)
- Vitamin ve mineral eksikliği

DÖL VERİMİNİ (gebe kalmayı) ETKİLEYEN FAKTÖRLER

- Ahır şartlarının kötü oluşu- Yetersiz beslenme
- Tohumlama zamanının iyi tespit edilememesi
- Kalitesiz sperma
- Rahim enfeksiyonları, Yumurtalık kistleri
- Bulaşıcı hastalıklar

KULLANIM ŞEKLİ

- EZO SÜT YEMİ**'ne yeni başlanıyor ise 12 gün alıştırlarak verilmeli.
- Günde en az 2 öğün verilmeli
- Kaliteli kaba yem ile birlikte verilmeli
- Günlük süt verimi 10-15 kg'a kadar olan sığırlarda sağım dönemi boyunca kullanılır.
- Su serbest olarak verilmeli

FAYDALARI

- Süt sığırlarının ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır.
- Süt verimini ve süt yağını arttırıcı özelliktedir.
- Ayrıca vitamin takviyesine gerek yoktur.
- Döl verimi üzerine olumlu etkileri vardır.

SÜT İNEKLERİNDE KABA YEM KULLANIMI

- En az 2-3 çeşit kaliteli kaba yem kullanılmalı.
- Yedirilen kaba yemlerin hepsinin su içeriği yüksek olmalı.
- Küflenmiş kaba yem kullanılmamalı.

BESİN DEĞERLERİ



Protein	16	Min %
Metabolik Enerji	2500	Kcal/Kg
Kalsiyum	0.8-1.5	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	15.000	IU/Kg
Vitamin D3	3.000	IU/Kg
Vitamin E	30	Mg/Kg


Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!



OYALI SİĞİR SÜT YEMİ 19.PR



% 19 Ham Protein 2700 kcal metabolik enerji içeren bu ürün kültür ırkı süt siğirlerinden üreticilerin daha fazla kazanmasını sağlayan bir yemdir.

Ambalaj

Fiziksel Şekli



PELET-GRANÜL

ASİDOZİS NEDİR?

Gebel olarak kaba yem partikülüne bağlı olarak çıkan, hayvanın yem seçmesine olanak yaratan durumlarda karşılaşılabılır.

- Süt ineklerinde asidozis daha çok doğum sonrası daki ilk ay içinde ortaya çıkar.
- Hayvanların enerji gereksinimlerinin karşılanması için fazla miktarda kesif yem verilmesi buna etkili bir faktördür.
- Günlük 9 kg üzeri kesif yem 2 öğün yemlemede veriliyorsa ise akut asidoz riski artar.
- Akut asidozistde rumen pH'sı 5'in altına düşer.
- Şiddetli vakalarda fizyolojik fonksiyonlar bozulabilir ve ölüm de görülebilir.

VERİM ARTIRICI ÖNERİLER

- Sağmal ineklerde gün ışığı ile birlikte 16 saat aydınlatma yapılmalıdır.
- Yazın serin saatlerde yemleme yapılmalıdır.
- Yemlikler sık sık karıştırılarak hayvanların yem yemesi sağlanmalıdır.

ASİDOZİS BELİRTİLERİ

- Süt veriminde düşme
- Süt yağında düşme
- Uygun enerji alımına rağmen kötü kondüsyon
- Yem ayıklama
- Açıklanamayan ishal
- Ayak problemleri vakalarıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

- OYALI SÜT YEM**'i ilk defa veriliyor ise 12 gün alıştırılarak verilebilir.
- Doğum sonrası problem yaşamamak için doğumdan 15 gün önce - **OYALI SÜT YEM**'ine başlanmalıdır.
- Süt verimi orta ve yüksek olan süt sığırlarına verilmelidir.
- Kaliteli kaba yem ile günde en az 3 öğün verilmelidir.
- Su serbest olarak verilmelidir.

FAYDALARI

- By pass protein ve enerji açısından zengindir.
- Düşük kaliteli kaba yemlerin kullanılmasına olanak sağlar.
- Yüksek kaliteli kaba yemlerle süt veriminde artış sağlar.
- Vücut kondisyonunu düşürmeden süt verimini artırır.
- Yüksek döl verimini sağlar.
- Doğumdan sonra oluşacak kist, sonun düşmemesi, keto zis süt humması gibi problemleri azaltır.

BESİN DEĞERLERİ



Protein	19	Min %
Metabolik Enerji	2700	Kcal/Kg
Kalsiyum	0.8-1.5	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	15.000	IU/Kg
Vitamin D3	3.000	IU/Kg
Vitamin E	30	Mg/Kg


Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!


unalçem



HAMARAT SİĞİR SÜT YEMİ 21.PR



% 21 Ham Protein 2800 kcal metabolik enerji içeren bu ürün kültür ırkı süt siğirlerinden üreticilerin daha fazla kazanmasını sağlayan bir yemdir.

Ambalaj



Fiziksel Şekli

PELET

KETOZİS NEDİR?

- Süt ineklerinin enerji gereksinimlerinin karşılanma sınırının sorun olduğu laktasyonun başlangıcında sıklıkla görülen metabolik bir problemdir.
- Diğer metabolik problemlerle (sonun atılamaması, metritis, abomasum kayması) birlikte gözlenebilir.
- En sık görüldüğü dönem doğum sonrası ilk 3 haftadır.
- Yem tüketiminin düşmesine neden olan diğer sebeplerle de ortaya çıkabilir.
- Temel olarak beslenmede yüksek protein ve yetersiz enerji takviyesi.

KETOZİS BELİRTİLERİ

- İştahsızlık ve canlı ağırlık kaybı,
- Rumen hareketlerinde düşme ve kabızlık,
- Hayvanlar zayıf ve kötü görünüşlüdürler,
- Süt verimleri düşer,
- Hareketlerinde yavaşlama olur,
- Deride kaba bir görünüş olur,
- Hayvanların nefesleri aseton kokulu olabilir.
- Kanda, sütte ve idrarda keton maddeleri artar,
- Ketoziste çok nadiren hayvan kaybı olur.

KULLANIM ŞEKLİ

- HAMARAT SÜT YEM**'i ilk defa veriliyor ise 12 gün alıştırılarak verilebilir.
- Doğum sonrası problem yaşamamak için doğumdan 15 gün önce - **HAMARAT SÜT YEM**'ine başlanmalıdır.
- Süt verimi yüksek sığırlarına verilmelidir.
- Sağm döneminde **HAMARAT SÜT YEM**'i verilecekse geçiş alıştırılarak yapılmalıdır.
- Su serbest olarak verilmelidir.

FAYDALARI

- By pass protein ve enerjice zengindir.
- Yüksek kaliteli kaba yemlerle süt veriminde artış sağlar.
- Vücut kondisyonunu düşürmeden süt verimini artırır.
- Yüksek döl verimini sağlar.
- Doğumdan sonra oluşacak kist, sonun düşmemesi, ketozis süt humması gibi problemleri azaltır.

Bilimsel araştırmalar hayvanlara verilen yemlerin kaç çeşit olursa olsun çeşitlerin tek tek verilmesi yerine karıştırılarak verilmesinin faydalı olduğunu kanıtlamıştır. Bu karışıma **TMR** uygulaması denir.


Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!

BESİN DEĞERLERİ

Protein	21	Min %
Metabolik Enerji	2800	Kcal/Kg
Kalsiyum	0.8-1.5	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	15.000	IU/Kg
Vitamin D3	3.000	IU/Kg
Vitamin E	30	Mg/Kg


unalçem



kuru
DÖNEM

YÜKLÜ
KURU
DÖNEM



% 16 Ham Protein 2500 kcal enerjili bu ürün süt siğirlerinin sütten kesiminden itibaren doğuma 15 gün kalana kadarki dönemde kullanılır.

Ambalaj

Fiziksel Şekli



PELET-GRANÜL

KURU DÖNEM BESLENMESİ

- Kurudaki ineklerin rasyonlarında kesif yem az selüloz oranı yüksek kaba yemler verilmeli
- Aşırıya kaçmadan tüm besin maddeleri gereksinimi karşılanmalıdır.
- Kurudaki ineklere verilecek yemler küflü ve kızışmış olmamalı
- Kuru dönemin son iki haftasında hayvanın laktasyon döneminde tüketeceği yemlerden oluşacak kesif yem verilmeye başlanır.
- Doğuma bir ay kala ineklere aşırı kalsiyum içeren yemler verilmemelidir. Aksi halde doğumla birlikte süt humması oluşur. (Kuru yonca otu verilmelidir.)
- Meme ödemi sorunlarının önüne geçmek için tuz ve sodyum içeren mineralleri sınırlandırmak gerekir.

KULLANIM ŞEKLİ

- Süt ineklerinin kuruya ayrıldıkları anda doğuma 15 gün kala kadar verilmelidir.
- Kuru dönem yemi en az 2 öğünde verilmelidir.
- Kaba yem olarak sadece saman kullanılmalıdır.
- Su serbest olarak verilmelidir.

FAYDALARI

- Gebe sığırların ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşıladığından;
- Süt Humması
- Ketozis
- Metritis
- Sonu atamama
- Döl verimi Problemlerini azaltır.

GEBE İNEKLER NDEDEN KURUYA ÇIKARTILIR?

- Anne karnındaki buzağının sağlıklı gelişimi için
- Meme dokularını dinlendirmek için
- Yıpranmış olan işkembeyi dinlendirmek için
- Sonraki laktasyona süt verimini artırmak için

BESİN DEĞERLERİ



Protein	16	Min %
Metabolik Enerji	2500	Kcal/Kg
Kalsiyum	0.8-1.5	Min-Max%
Fosfor	0.50	Mn %
Vitamin A	15.000	IU/Kg
Vitamin D3	3.000	IU/Kg
Vitamin E	30	Mg/Kg


Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!


unalçem



NAZLICAN
D VE
YEMI



% 16 Ham Protein 2700 kcal enjili bu  r n damızlık ve gebe d velerin beslenmesinde kullanılır.

Ambalaj



Fiziksel  ekli

PELET

DAMIZLIK DÜVELERİN BESLENMESİ

- 6 aylık yaştan, doğuma kadar olan dönemi kapsar
- Dişi damızlık buzağılara 4 aylıkyaşa gelinceye kadar, kötü kaliteli kaba yem verilmemelidir.
- Düvelerde meme gelişimi 4-9 aylık yaşlarda olur
- Düveler normal şartlarda 9-11 aylıkken kızgınlık göstermeye başlar. Eğer daha erken kızgınlık gösterirse bu durum hatalı beslenmeden kaynaklanır.
- Aylık olarak canlı ağırlık artışları takip edilmeli. Günlük 700-800 gr canlı ağırlık artışı sağlanmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

- NAZLICAN DÜVE YEMİ**'i en az 2 öğünde verilmeli ve düveler 700-800 gr/gün canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde beslenmelidir.
- NAZLICAN DÜVE YEMİ**'i verilmesine dişi buzağılar 150 günlük olduktan sonra başlanmalıdır.
- Doğuma 15 gün kala sonlandırılarak süt yemine geçilmelidir.
- Eğer düve yemine yeni başlıyorsanız, düveler 8-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

- Düvelerde, 12 aylık yaşa gelinceye kadar, günlük 6-8 kg mısır silajı, 3-4 kg kuru ot 3 kg NAZLICAN DÜVE YEMİ verilebilir. Aylık olarak canlı artışı takip edilmeli.
- Düveler 15-17 aylık yaşa ulaştıklarında tohumlama yapılmalıdır.
- Doğuma 15 gün kala OYALI süt yemine geçilmelidir.
- Düveleri çok yoğun besleme programına almak doğru değildir. Aşırı dengesiz beslenme döl tutmama problemlerine yol açar.

FAYDALARI

- Dengeli enerji ve protein yapısı ile sağlıklı gelişim sağlar
- Uygun meme gelişimi sağlanmasına yardımcı olur
- Döl verimini artırır
- Ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.

BESİN DEĞERLERİ



Protein	16	Min %
Metabolik Enerji	2700	Kcal/Kg
Kalsiyum	1.0-2.0	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	15.000	IU/Kg
Vitamin D3	3.000	IU/Kg
Vitamin E	30	Mg/Kg


Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!


unalçem



bařlangıç
YEMLERİ

TOMURCUK
BUZAđI
BAřLANGIÇ



% 18 Ham Protein 2800 kcal enjili ieren bu rn 1-8 hafta-
lık yařtaki buzađıların beslenmesinde kullanılır.

Ambalaj



Fiziksel řekli

PELET

DOĞUM İŞLEMLER

- Doğuma bir hafta kala anne,bol altlıklı,temiz,havadar hafif loş bir bölüme alınır.
- Doğan buzağının burun boşlukları ve ağız çevresi süratle temizlenir.
- Annenin yavruyu yalaması sağlanır. O yapmazsa bu işlem bakıcı tarafından temiz bir havlu ile yapılmalıdır.
- Göbek kordonu 5-6 cm bırakılarak kesilmeli,içerisindeki

- kan boşaltılarak tentürdüyot ile dezenfekte edilmeli,buzağı iki günlük olunca tekrar kontrol edilmeli.
- İlk 30dk. içerisinde 1lt kadar 24 saat içerisinde de 3-4 defa ağız sütü biberonla buzağıya içirilir.
- Verilen süt vucut sıcaklığına 37,5+1C olmalıdır.
- Buzağıya 5. günden itibaren TOMURCUK BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ verilebilir.

KULLANIM ŞEKLİ

- TOMURCUK BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEM**'i buzağların doğumundan sonraki 5. Günden itibaren 60. Güne kadarki beslenmesinde kullanılır.
- Buzağlar 800-900 gr yem tüketmeye başladıklarında sütün kesilebilirler.
- 60. Günden itibaren HIRÇIN BUZAĞI BÜYÜTME YEM'i-ne geçilmeli, buzağlara kesinlikle kalitesi düşük kaba yemlr verilmemelidir.

FAYDALARI

- Buzağların tüm besin madde ihtiyacını karşılar.
- Sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
- Vitamin - Mineral takviyesine gerek yoktur.
- İşkembede mikrobiyol sindirim gelişimini gelişimini hızlandırır.
- Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar
- Sütün kesilmeyi kolaylaştırır.

BUZAĞI YAŞI (gün)	YAĞLI SÜT lt	BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ	KURU OT	SU
0-5 gün	4-6 lt ağız sütü	--	--	serbest
6.gün 3.hafta	4-6 lt gün	serbest	--	serbest
3.-5. hafta	4-5 lt/gün	serbest	serbest	serbest
5.-6. hafta	2 lt/gün	serbest	serbest	serbest
8. hafta	--	serbest	serbest	serbest

BESİN DEĞERLERİ

Protein	18	Min %
Metabolik Enerji	2800	Kcal/Kg
Kalsiyum	1.0-2.0	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	20.000	IU/Kg
Vitamin D3	3.000	IU/Kg
Vitamin E	25	Mg/Kg


Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!


unalçem



Üstün**Kalite**
SEKTÖRDE
26
YILIMIZ







b y tme
YEMLERİ

HIR IN
BUZAđI
B Y TME



% 17 Ham Protein 2600 kcal metabolik enerji i eren bu  r n
2-5 aylık buzađıların beslenmesinde kullanılır.

Ambalaj

Fiziksel  ekli



PELET

BUZAĞI BESLEME (2-5 ay)

- Buzağılar bireysel bölmelerden alınarak gruplar oluşturulur. Bölme kuru ve havadar olmalıdır.
- Süt kesiminden sonra buzağıyla HIRÇIN BÜYÜTME YEM'i yiyebildiği kadar verilmelidir.
- Yiyebildiği kadar kaliteli kuru ot verilmelidir.
- Sürekli taze ve temiz su verilmelidir.
- Pancar posası ve taze biçilmiş yonca gibi sulu yemler verilmez.

İSHALİ HAZIRLAYAN SEBEPLER

- Yetersiz temizlik - Yetersiz havalandırma
- Yetersiz ağız sütü-Güç doğum
- Annenin yeteri kadar beslenememesi, parazitli olması
- Aşırı kalabalık barınaklar
- Ortam veya beslenme kaynaklı sebepler
- Enfeksiyon kaynaklı sebepler
- Buzağının annesini serbest emmesi
- Buzağının fazla süt içmesi
- Biberon ile beslenen buzağılarsa sütün soğuk verilmesi

KULLANIM ŞEKLİ

- Buzağılar 61 günlük olduklarında **HIRÇIN BUZAĞI BÜYÜTME YEM**'ine geçmeli geçiş işlemi, yavaş yavaş alıştırlarak yapılmalı.
- HIRÇIN BUZAĞI BÜYÜTME YEM**'i buzağılar 5 aylık oluncaya kadar kullanılmalıdır. 8-10 aya kadar devam edilebilir.
- Dişi damızlık buzağılar 5.Aydan sonra **NAZLICAN DÜVE YEM**'i ile beslenebilir.
- Su serbest olarak verilmelidir.

FAYDALARI

- Buzağılarda hızlı ağırlık artışı ve büyüme sağlar
- İşkemenin gelişimini saplayarak yemden yararlanmayı artırır
- Vitamin-mineral katkısına gerek yoktur
- Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.

BUZAĞI YAŞI (gün)	BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ	YONCA KURU OT	SU	SİLAJ
2-4 ay	serbest	serbest	serbest	0
4-6 ay	serbest	serbest	serbest	2

BESİN DEĞERLERİ

Protein	17	Min %
Metabolik Enerji	2600	Kcal/Kg
Kalsiyum	1.0-2.0	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	20.000	IU/Kg
Vitamin D3	3.000	IU/Kg
Vitamin E	25	Mg/Kg


Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!


unalçem



%14 Ham Protein, 2500 kcal metabolik enerji içeren bu ürün besi başlangıcından besi sonuna kadar kullanılacak besi yemidir.

Ambalaj

Fiziksel Şekli



PELET-GRANÜL-TOZ

BESİDE GENÇ HAYVAN KULLANMA- NIN FAYDALARI

- Günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma yüksektir.
- Genç hayvanlarda et yönlü canlı ağırlık artışı sağlanırken, yaşlı hayvanlarda ise yağ yönlü birikim sağlanır.
- Genç hayvanlarda yağ kas arasına dağılır, yaşlılarda iç yağı olarak birikir kiloya dahil edilemez.
- Yemden yararlanmanın en yüksek olduğu dönem 1,5 yaşına kadar olan dönemdir.

BESİDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

- Yaş ve canlı ağırlıklara göre gruplandırma yapılmalıdır.
- Besiyeye kaba yem ağırlıklı başlanmalı ve zamanla kaba yem azaltılarak kesif yem arttırılmalıdır.
- Belli aralıklarla ağırlıklı tespiti yapılmalıdır
- Küfsüz ve lezzetli kaba yemler yem tüketimini azaltır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Besiyemi 1 hafta içinde yavaş yavaş alıştıırılarak verilmelidir.
- Günde en az 2 öğün verilmelidir.
- Kaliteli kaba yemle hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
- Su serbest olarak verilmelidir.
- C.A. oranına göre yemde artış orantılı olmalıdır.

FAYDALARI

- Sindirilebilirliği yüksek olduğundan hızlı canlı ağırlık artışı.
- Yüksek Karkas Kalitesi ve Randıman artırıcı özellik
- Vitamin mineral takviyesine gerek yoktur.

- Besideki hayvanlar iştah ve sağlık yönünden kontrol edilmelidir.
- Su serbest olarak verilmelidir.
- Ahır sıcaklığı 15 – 20C olmalı 22C üstü sıcaklıkta canlı ağırlık artışı düşer.
- Kapalı ahırlarda hayvan tımar edilmelidir.

BESİ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İrk – Cinsiyet – Yaş – Kondisyon
– Sağlık – Beslenme – Çevre

Protein	14	Min %
Metabolik Enerji	2500	Kcal/Kg
Kalsiyum	1.0-2.0	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	7.000	IU/Kg
Vitamin D3	2.000	IU/Kg
Vitamin E	30	Mg/Kg

BESİN DEĞERLERİ




Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!


unalçem



%18 Ham protein, 2600 kcal metabolik enerji içeren bu ürün, besi başlangıcından besinin son 2 ayına kadar kullanılacak besi yemidir.

Ambalaj



Fiziksel Şekli

PELET-GRANÜL

BESİDE YAPILAN HATALAR

- Çok ufak doğranmış kaba yem verilmesi.
- Fabrika yemine ilavelerin yapılması.
- Yemin aşırı ıslatılması.
- Daha yüksek ağırlık elde etmek için uzun süre besi yapılması.
- Soğuk havada hayvanın üşüdüğü düşünülmesi.
- Kapalı ve bağlı sistemde besinin daha iyi olduğu düşünülmesi.
- Besi hayvanları kastre (kısırlaştırma) edilmesi.

ÖĞÜNLÜ SULAMANIN ZARARLARI

- İşkembede 24 saat sürmesi gereken sindirim faaliyetinde kesintiler oluşur.
- Yemden yararlanma ve canlı ağırlık artışı azalır.
- Yem tüketimi azalır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Besideki dana veya tosunlara LEBLEBİ BESİN YEMİ yedirilmişse 8 – 10 günlük alıştırma devresinden sonra YÜREKLİ BESİN YEM'ine geçilir.
- Dana ve tosunlar yeni besiye alınıyorsa 1 hafta alıştırılarak verilmeli.
- Ezme yapılmış tahıl ürünleri ile karma yapılabilir.
- Tüm besi boyunca kullanılabilir.
- Su serbest olarak verilmeli.

FAYDALARI

- Danaların hızlı büyümesi ve hızlı canlı ağırlık artışı için özel olarak hazırlanmıştır.
- Kaba yemin kaliteli olmadığı bölgeler için çok uygun besi yemidir.
- Besi bitirme yemine geçişi kolaylaştırır.
- Enerji – protein, vitamin – mineral dengesi mükemmeldir.
- Ayrıca vitamin takviyesine gerek yoktur.
- Kaliteli ve lezzetli hammaddelerden üretilmiştir.

BESİN DEĞERLERİ



Protein	18	Min %
Metabolik Enerji	2600	Kcal/Kg
Kalsiyum	1.0-2.0	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	7.000	IU/Kg
Vitamin D3	2.000	IU/Kg
Vitamin E	30	Mg/Kg


Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!


unalçem



SONA SİĞİR BESİ BİTİRME



%14 Ham protein, 2700 kcal metabolik enerji içeren bu ürün, besinin son döneminde kullanılabilecek mükemmel besi yemidir.

Ambalaj



Fiziksel Şekli

PELET-GRANÜL

SATIN ALINAN VE İŞLETMEYE GETİRİLEN HAYVANLARIN BESİYE HAZIRLANMASI

- İşletmeye yeni gelen hayvanlar diğer hayvanlardan ayrı bir yere konulmalıdır. Bölme temiz ve dezenfekte edilmiş olmalıdır.
- Gelen hayvanlar canlı ağırlık, boynuzluluk ve daha önceki yetiştirme koşulları gibi faktörler dikkate alınarak gruplandırılır.
- Hayvanlar işletmeye ilk geldiklerinde, iç ve dış parazit mücadelesi yapılmalıdır.
- Koruyucu aşılar yapılmalıdır.
- İşletmeye yeni gelen hayvanlara birkaç saat dinlendikten sonra temiz su verilmelidir. İşletmeye yeni gelmiş hayvanlar için otomatik suluklar hayvanların alışma zorluğu nedeniyle tercih edilmemelidir.
- İşletmeye yeni gelmiş hayvanların yemliklerinde 1. gün sınırlı miktarda kuru ot bulundurulmalıdır. Kuru ot ile 1 kg'a kadar kesif yem de konabilir.
- Besi yemine adaptasyon, kaba/kesif yem oranı değiştirilerek yapılır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Besi kısa süreli yapılacaksa besi başlangıcından itibaren SONA BESİ BİTİRME YEMİ verilmelidir.
- Yüksek metabolik enerjiye sahip besi bitimine 2 – 2,5 ay kala başlamak ve önceki kullanılan yemle 1 hafta karıştırılarak geçiş kolaylaştırılmalı.
- Besiye SONA BESİ BİTİRME YEM'i ile başlanacak ise 1 hafta gün alıştırılarak verilmelidir.
- Kırılmış veya ezilmiş herhangi bir tahıl ürünü eklemeye gerek yoktur.
- Kaliteli kaba yemle yüksek canlı ağırlık kazancı sağlar.
- Su serbest olarak verilmeli.

FAYDALARI

- Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
- Ette mozaikleşmeyi sağlayarak et kalitesini artırır.
- Besi sonuna doğru artan enerji ihtiyacını karşılar.
- Karkas kalitesini ve randımanı arttırıcı özelliktedir.
- Ayrıca katkı maddelerine gerek yoktur.

BARINDIRMA ŞARTLARININ VERİM ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ

Havalandırma	10
Sulama	10
Aydınlatma	5
Serbest Dolaşım ve Hijyen	10
TOPLAM VERİM KAYBI	%35

BESİN DEĞERLERİ

Protein	14	Min %
Metabolik Enerji	2700	Kcal/Kg
Kalsiyum	1.0-2.0	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	7.000	IU/Kg
Vitamin D3	2.000	IU/Kg
Vitamin E	30	Mg/Kg


Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!


unalçem



Ambalaj

• Net •

40 Kg.

Fiziksel Şekli

PELET

CİNBAŞ KUZU BAŞLANGIÇ

Bu yem kuzuların 2 – 8 hafta sonuna kadarki beslenmelerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Kuzulara 15. günden itibaren CİNBAŞ KUZU BAŞLANGIÇ YEM'ine başlanmalıdır.
- Kuzular yavaş yavaş alıştırılır. Günlük verilecek yem 2 – 3 defada verilmeli.
- Su serbest olarak verilmeli.

FAYDALARI

- İşkembenin gelişimine uyarıcı etkisi vardır. Sağlıklı hızlı gelişim sağlar ve sütten kesimi kolaylaştırır.
- Ayrıca vitamin mineral takviyesine gerek yoktur.
- Kuzularda kanlı ishali önlemek amaçlı, geniş tabanlı ağıl ve zemin bir miktar yerden yüksek ağaçtan yapılmış ızgara şeklinde olmalıdır.



Ambalaj



Fiziksel Şekli

PELET

SÜMBÜL KUZU BÜYÜTME

Bu yem kuzuların 8 – 18 hafta sonuna kadarki beslenmelerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

- CİNBAŞ KUZU BAŞLANGIÇ YEM'inden SÜMBÜL KUZU BÜYÜTME YEM'ine alıştırılarak geçilmeli.
- Kaliteli kuru kaba yemle tüketilmeli.
- Günlük verilecek yem 2 – 3 defada verilir.
- Su serbest olarak verilmeli.
- Erken kesim yapılacaksa 13 – 14. haftalarda ÇAKIR TOKLU YEM'ine geçilmeli.

FAYDALARI

- Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar iştahın gelişimini hızlandırır.
- Kaliteli et ve yapağı verimi sağlar ayrıca vitamin mineral takviyesine gerek yoktur.



besi
YEMLERİ

ÇAKIR
TOKLU
BESİ



Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!



%14 Ham protein 2700 kcal enerjili bu ürün, kuzuların 5. ay-
dan itibaren beslenmelerinde kullanılır.

Ambalaj

Fiziksel Şekli



PELET-GRANÜL



KULLANIM ŞEKLİ

- ÇAKIR TOKLU YEM'i 10 – 15 gün alıştırtılarak verilmeli.
- 30 – 35 kg canlı ağırlığa kadar günlük 1 – 1,5 kg ÇAKIR TOKLU YEM'i verilmeli.
- ÇAKIR TOKLU YEM'i 3 öğünde verilmelidir.
- Kuru ot ve su serbest olarak verilmelidir.

FAYDALARI

- Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
- Lezzetli ve kaliteli hammaddelerden üretilmiştir.
- By pass özelliği yüksek olduğundan kısa zamanda istenilen besiyi sağlar.
- Ayrıca vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç yoktur.


BESİN DEĞERLERİ



Protein	14	Min %
Metabolik Enerji	2700	Kcal/Kg
Kalsiyum	1.0-2.0	Min-Max%
Fosfor	0.5	Mn %
Vitamin A	20.000	IU/Kg
Vitamin D3	3.000	IU/Kg
Vitamin E	25	Mg/Kg

BAŞLICA ETÇİ SİĞİR IRKLARI

Angus




Annelik özellikleri, doğum kolaylığı ve mermerleşme özelliği ile ünlü, orjinal olarak siyah ve boynuzsuz bir ırktır.

Belçika Mavisi




Hızlı büyüme ve yemden yararlanma oranının yüksek oluşuyla ünlü bir ırktır.

Limousin



Fransa kökenli bir ırktır. Siyah, Kırımızı, boynuzlu ve boynuzsuz soyları vardır. Kas gelişimi ve yemden yararlanmasının yüksek olmasıyla ünlüdür.

Simmental



ABD'de etçi ırklardan kabul edilen bir kombine ırktır. 5/8 Simmental, 3/8 Brahman kombinasyonu, Güney Teksas'ta elde edilmiş SİMBRAH ırkı çok iyi gelişen fertilité, süt verimi, karkas kalitesi, hastalık ve dış parazitlere dayanıklı, adaptasyon yeteneği, uzun ömürlülüğü ile ünlü bir ırktır.

Hereford



İngiltere kökenli bir ırktır. Kahverengi - kırmızı vücudu, beyaz başıyla dikkati çeker. Gerden bölgesi de çoğunlukla beyazdır. Uzun ömürlü her koşula dayanıklı, kolay idare edilebilen bir ırk olup, boynuzlu ve boynuzsuz soyları vardır.

YEMLERİN KULLANIMI

YEMİN ADI

KULLANILDIĞI DÖNEM

EZO 16-2500	Düşük süt verimli ineklerin beslenmelerinde ve doğum sonrası 150. günden sonra kullanılır.
OYALI 19-2700	15-20 lt'den yüksek süt verimli ineklerin beslenmelerinde kullanılır.
HAMARAT 21-2800	25-30 lt'nin üstünde süt veren ineklerin beslenmelerinde kullanılır.
YÜKLÜ 16-2500	Süt Sığırlarının Kuru Dönemdeki beslenmesinde ve doğuma son 60 gün kala kullanılır.
NAZLICAN 16-2700	6 aydan büyük dişi damızlıkların doğuma 15 gün kalana kadarki beslenmelerinde kullanılır.
TOMURCUK 18-2800	Buzağların 5. günden 2. aya kadarki beslenmelerinde kullanılır.
HIRÇIN 17-2600	2. aydan 6. aya kadarki buzağların beslenmelerinde kullanılır. 8. aya kadar uzatılabilir.
LEBLEBİ 14-2500	6 aydan büyük danaların beslenmelerinde kullanılır.
YÜREKLİ 18-2600	6 aydan büyük kültür ırkı besi danalarının beslenmelerinde ve 9. ay itibariyle 250 gr Arpa Ezmesi ile besiye devam edilir.
SONA 14-2700	Kesimine 75 gün kalmış hayvanların beslenmesinde kullanılır. Son 3 ay da kullanılabilir.
CİNBAŞ 18-2800	Kuzuların 2. aya kadarki beslenmelerinde kullanılır. Kuzulara serbest olarak verilir.
SÜMBÜL 17-2600	2. aydan 6. aya kadarki kuzuların beslenmelerinde kullanılır ve serbest olarak verilmelidir.
ÇAKIR 14-2700	Yüksek enerjili tahıl taneleri yanında 1 kg verilmelidir.



NEDEN PELET ve GRANÜL YEM KULLANMALIYIZ

PELET ve GRANÜL YEMLER İŞİL İŞLEME TABİ TUTULDUKLARINDAN SİNDİRİLEBİLİRLİĞİ YÜKSEKTİR.

PELET ve GRANÜL YEMLERİN DEPOLAMA ÖMRÜ DAHA UZUNDUR

PELET ve GRANÜL YEMLERDE BESİN DEĞERİ DAHA HOMOJENDİR

PELET ve GRANÜL YEMLERDE KAYIP DAHA AZDIR

PELET ve GRANÜL YEMLER UĞRADIKLARI ISIL İŞLEMEN DOLAYI DAHA HİJYENDİR

PELET ve GRANÜL YEMLERDE TOZ OLMADIĞINDAN SOLUNUM YOLU PROBLEMİ YARATMAZ

ÜRETİCİLERİN DAHA FAZLA KAZANÇ ELDE ETMELERİ İÇİN
PELET ve GRANÜL YEM ÖNERİYORUZ





Sağlıklı gelecek için
kaliteli yem!



Büro Fabrika

Adres : Cengiz Topel Caddesi No:112 ÇORUM

Tel : 0 364 2134881

Fax : 0 364 2126162

Adres : Çorum 1.Organize Sanayi Bölgesi

Tel : 0 364 2549146

Fax : 0 364 2549726



gencmodya.com.tr